



Utrecht, 20 januari 2021
Betreft: Covid-19 vaccinatie

Geacht lid,

De laatste tijd hebben wij veel telefoontjes gekregen over vaccineren. Wij zetten de adviezen voor je op een rijtje. Voor de meeste van onze patiënten geldt dat het veilig is om je te laten vaccineren. Het advies van de afdeling Nierziekten van het LUMC vonden wij zeer duidelijk en helder, daarom hebben wij dit advies hier toegevoegd. Bij ernstige ziekte is het altijd raadzaam te overleggen met je eigen specialist.

NVR - Nederlandse Vereniging voor Reumatologen

Voor patiënten met reumatische aandoeningen geldt zonder uitzondering:

Laat je vaccineren. Dit is veilig. Wanneer je een oproep krijgt voor de vaccinatie wordt door de Rijksoverheid bepaald. Houd deze website en de RIVM in de gaten voor nieuwe informatie.

Voorlopige advies LUMC

Als afdeling Nierziekten van het LUMC hechten wij grote waarde aan het vroegtijdig vaccineren van nierpatiënten. In afwachting van het definitieve advies van de landelijke organisaties verwachten wij dat vaccinatie met het huidige beschikbare en goedgekeurde Pfizer- en het Moderna vaccin zeer veilig en effectief is. Nierpatiënten zijn een kwetsbare groep met een verhoogd risico op het krijgen van ernstige symptomen van een COVID-19 infectie. Het vaccineren zal het risico van nierpatiënten verlagen op een ernstig verloop van een COVID-19 infectie. Hierdoor bescherm je niet alleen jezelf maar zal ook het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met een COVID-19 infectie fors afnemen.

Uitzonderingen

Patiënten waar wij het vooralsnog niet verstandig vinden om te vaccineren:

- Transplantatiepatiënten, die minder dan 6 weken geleden getransplanteerd zijn. Er is waarschijnlijk grotere kans op bescherming door het vaccin wanneer vaccinatie na 6 weken plaats vindt.
- Transplantatiepatiënten, die minder dan 3 maanden geleden behandeld zijn voor afstoting (met alemtuzumab). Er is meer kans op bescherming door het vaccin na 3 maanden toe te dienen.
- Patiënten met vasculitis of SLE die minder dan 6 maanden geleden behandeld zijn met Rituximab.
- Patiënten die minder dan 4 weken geleden een bewezen COVID-infectie hebben doorgemaakt
- Vrouwen die zwanger zijn. Omdat het vaccin niet eerder aan zwangeren is toegediend, wordt vooralsnog afgeraden om tijdens de zwangerschap te vaccineren.

Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht

088 – 0157000
info@nvle.org
www.nvle.org

KvK: 40533149
RSIN/ANBI: 7551083
NL67RABO0127463542

Geen definitief advies

Eerder genoemde voorlopige richtlijn betreft dus nog geen definitief advies. Op basis van het landelijk overleg kunnen aanpassingen volgen. Deze zullen op de website van het LUMC weergegeven worden.

NVOG – Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren.

De werkgroep adviseert vrouwen met onderliggende ernstige ziekten, ook in de zwangerschap, wel te vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie. Voor welke aandoeningen dit geldt, kijk op de website van de NVOG.