

Vraag en antwoord vaccins en APS (Dr. Marc Bijl, lid van onze Medische adviesraad)

1. Kunnen de vaccins van Pfizer en Moderna ook bij antistollingsmedicatie veilig gegeven worden?

Antwoord: Ja voor bijvoorbeeld de griepvaccinatie adviseren wij ook niet de antistolling te staken. Het is veilig. Mochten mensen het zelf niet wenselijk achten om antistolling te gebruiken adviseer ik aspirine 5 dagen, acenocoumarol 3 dagen en een DOAC 2 dagen tevoren te staken. Nogmaals dat is niet het medisch advies.

2. Zijn er bepaalde voorzorgen nodig voor APS-patiënten met antistollingsmedicatie?

Antwoord: Ik zie hierbij geen rol voor extra voorzorgen.

3. Voor antistolling met coumarinederivaten: in welk gebied mag de INR zich bevinden voor een veilige vaccinatie?

Antwoord: advies is gewoon doorgebruiken net zoals bij de griepvaccinatie gebruikelijk is. Een streef INR zal ik dan ook niet geven. Het is gewoon doorgebruiken of acenocoumarol 3 dagen tevoren staken. Fenprocoumon zou ik 7 dagen tevoren staken. Geen INR tevoren meten.

4. Zijn er extra voorzorgsmaatregelen nodig bij mensen met een sterk wisselende INR?

antwoord: niet meten in het kader van de vaccinatie.

5. Heb jij nog andere inzichten die je in dit opzicht met mij zou kunnen delen?

antwoord: Nee, de vaccins lijken op theoretische gronden veilig en effectief bij APS patienten. Dat is dus een klein voorbehoud, ze zijn immers nog niet in studieverband bij APS patienten toegediend.